

## QUY TRÌNH CANH TÁC GIỐNG ĐẬU BẮP TRÁI XANH SUPER 126

### 1. Đặc điểm của giống và thời vụ gieo trồng:

- Giống có khả năng chịu nhiệt tốt, kháng bệnh cao, cây thấp, thời gian thu hoạch dài. Quả màu xanh đậm, dài 14-16 cm, chất lượng ăn giòn và ngọt. Thu hoạch lần đầu sau gieo 45-50 ngày. Năng suất đạt từ 20-25 tấn/ha.

- Thời vụ: Giống có thể trồng quanh năm tại tất cả các vùng sinh thái trên cả nước. Tuy nhiên đậu bắp là loại cây trồng ưa sáng, chịu nhiệt tốt nên sẽ phát triển mạnh vào thời điểm khí hậu ẩm áp, ít mưa kéo dài.

### 2. Đất trồng:

Cây có khả năng thích nghi với nhiều loại đất. Đất nhẹ, tơi xốp, thông thoáng, giàu chất dinh dưỡng giúp cây cho năng suất cao, chất lượng tốt. Độ pH thích hợp nhất từ 6-6.5.

Chọn đất cao, thoát nước tốt và chủ động được nguồn nước tưới, vệ sinh vườn trồng, dọn sạch tàn dư thực vật của vụ trước, bón vôi rồi cày bừa đất tơi xốp.

Lên luống cao 15-20cm vào mùa khô, những nơi đất thấp hay trồng mùa mưa phải lên cao 25-30 cm để dễ thoát nước.

Khoảng cách trồng:

+ Hàng đôi cách hàng đôi 1,4-1,5 m.

+ Lỗ trồng cách nhau 0,45-0,5 m (mỗi lỗ bỏ 2 hạt, khi cây có 2-3 lá thật thì tỉa bớt chỉ để lại 1 cây khỏe).

### 3. Xử lý hạt giống và gieo hạt:

- Lượng giống cần cho 1ha: 5 - 7 kg

- Có thể gieo trực tiếp không qua ngâm ủ.

- Sau khi gieo lấp 1 lớp đất mỏng hoặc phủ xơ dừa lên hạt, tưới nước thật đẫm và tưới giữ ẩm hàng ngày cho hạt nảy mầm. Kiểm tra độ ẩm đất thường xuyên để tránh hiện tượng quá khô hoặc quá ẩm sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ nảy mầm của hạt.

### 4. Bón phân:

Lượng bón và cách bón phân tham khảo cho 1 ha như sau:

Phân chuồng hoai: 15-20m<sup>3</sup>, vôi bột: 300-500kg, tùy theo pH đất canh tác;

- Phân vô cơ lượng nguyên chất: 160 kg N - 85 kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> - 140 kg K<sub>2</sub>O.

*Lưu ý: Chuyển lượng phân hóa học nguyên chất qua phân đơn hoặc NPK tương đương:*

- Cách bón:

Bón lót toàn bộ phân chuồng hoai, vôi bột, 45%N + 100%P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> + 45% K<sub>2</sub>O khi làm đất.

Bón thúc lần 1: Khi cây có 2 - 3 lá thật, 15 % N + 15 % K<sub>2</sub>O.

Bón thúc lần 2: Khi cây có 5-6 lá thật 20 % N + 20 % K<sub>2</sub>O.

Bón thúc lần 3: Khi cây nở hoa rộ, 20 % N + 20 % K<sub>2</sub>O.

### **Chăm sóc:**

#### **+ Tưới nước:**

Mùa nắng tưới ngày 2 lần vào sáng sớm và chiều mát đảm bảo độ ẩm đất, mùa mưa tưới ngày 1 lần hoặc không tưới, làm rãnh thoát nước tránh bị ngập úng.

Khi bón thúc, tưới vừa đủ đảm bảo phân tan nhưng không làm trôi phân.

#### **+ Chăm sóc:**

Làm sạch cỏ trên luống, rãnh và xung quanh vườn, làm trước khi bón phân để hạn chế cạnh tranh dinh dưỡng với cây trồng.

Thăm đồng thường xuyên để phát hiện sâu bệnh kịp thời.

### **5. Phòng trừ sâu bệnh:**

**Các Loại côn trùng gây hại thường gặp:** Sâu xám, sâu vẽ bùa, sâu xanh ăn lá, rầy xanh, ruồi đục trái, bọ trĩ, rầy nhót, bọ phấn trắng...

**Các Loại bệnh hại thường gặp:** Bệnh phấn trắng, đốm lá, cháy lá, thán thư, ...

**Biện Pháp phòng trừ:** Áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM

#### **+ Biện pháp canh tác kỹ thuật:**

Thời vụ: Bố trí thời vụ thích hợp với từng vùng miền, bố trí công thức luân canh, xen canh với các giống cây trồng khác họ.

Vệ sinh đồng ruộng: Loại bỏ các cây (hoặc các phần cây) bị nhiễm bệnh trên đồng ruộng, thu gom tập trung và xử lý sẽ giúp ngăn ngừa sự lan truyền của các tác nhân gây bệnh tới các cây khỏe.

Xử lý đất: Phơi ải, ngâm ruộng để diệt mầm bệnh và trứng, nhộng ở trong đất.

#### **+ Biện pháp sinh học:**

Sử dụng các chế phẩm sinh học để phòng trừ sâu bệnh hại, hạn chế sử dụng thuốc hóa học có độ độc cao ảnh hưởng đến thiên địch có lợi như ong ký sinh, bọ xit bắt mồi, nhện bắt mồi....

#### **+Biện pháp vật lý:**

Bẫy côn trùng: Sử dụng các loại bẫy bả như bẫy chua ngọt, bẫy dính, bẫy pheromone, bẫy đèn... để bắt côn trùng trưởng thành.

Sử dụng màng phủ đất để hạn chế cỏ dại và một số dịch bệnh trong đất.

#### **+ Biện pháp hóa học:**

Sử dụng hóa chất khi cần thiết và hợp lý, sau khi áp dụng các biện pháp trên không có hiệu quả, khi mật độ dịch hại phát triển đến ngưỡng gây thiệt hại về kinh tế. Tuy nhiên, khi sử dụng thuốc phải cân nhắc kỹ theo nguyên tắc 4 đúng (đúng chủng loại, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đúng cách) và nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc trước khi dùng.

*Lưu ý: Không sử dụng các loại thuốc có những hoạt chất cấm sử dụng.*

## 6. Thu hoạch:

Khi cây được 45-50 ngày sau gieo sẽ cho thu hoạch trái đợt đầu, tiến hành thu hoạch khi quả đạt kích thước thương phẩm đặc trưng của giống, thường cách 1-2 ngày thu 1 lần. Thu hái khi quả còn non, mới hình thành hạt.

Đóng gói, vận chuyển theo yêu cầu của khách hàng. Đóng gói cẩn thận để không bị dập trong quá trình vận chuyển.

Trước khi thu hoạch cần phải cách ly thuốc BVTV và phân bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất phân, thuốc để đảm bảo an toàn cho người sử dụng./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2026  
**CÔNG TY TNHH HẠT GIỐNG THỊNH NÔNG**  
(Ký tên, đóng dấu)

**GIÁM ĐỐC**



*Phan Thị Triều Tâm*