

QUY TRÌNH CANH TÁC GIỐNG MƯỚP HƯƠNG SUPER 662

1. Đặc điểm của giống và thời vụ gieo trồng:

- Giống sinh trưởng khỏe, chống chịu bệnh tốt. Quả dài 30 - 35 cm, màu xanh, sọc mờ, trọng lượng trung bình 200 - 230 gram, rất đặc ruột, ăn ngon và có mùi thơm đặc trưng. Thu hoạch 40 - 45 ngày sau gieo. Năng suất đạt từ 30 - 40 tấn/ha.
- Thời vụ: Trung du miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng gieo từ tháng 01-03 và tháng 07-10; Bắc Trung bộ, Duyên hải Nam Trung bộ gieo từ tháng 12 đến tháng 05 năm sau; Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long trồng được quanh năm, vụ chính Đông Xuân và Xuân Hè.

2. Đất trồng:

Đất trồng có thành phần cơ giới nhẹ, thoát nước tốt, phù hợp nhất là đất thịt pha cát. Vệ sinh vườn trồng, dọn sạch tàn dư thực vật của vụ trước, cày bừa đất tơi xốp. Bón 300-500 kg vôi/ha, nếu pH đất <6 phải tăng lượng vôi, sau khi bón vôi 10-15 ngày thì tiến hành bón lót, lên luống và phủ bạt. Khoảng cách trồng: Hàng đơn cách nhau: 1,8-2 m; Cây cách cây 0,5-0,6 m.

3. Xử lý hạt giống và gieo hạt:

Mật độ trung bình 9.000-10.000 cây/ha.

Ngâm hạt trong nước ấm (2 sôi + 3 lạnh) trong 4-6 giờ sau đó vớt ra ủ vào khăn ẩm, sau khi ủ 36-48 giờ hạt nứt nanh thì đem gieo (nếu thời tiết lạnh thời gian hạt nảy mầm có thể kéo dài hơn).

Có thể gieo thẳng hoặc gieo vô bầu.

4. Bón phân:

Lượng bón và cách bón phân tham khảo cho 1 ha như sau:

Phân chuồng hoai: 25-30 m³, phân hữu cơ vi sinh: 1.000kg; vôi bột: 300-500kg, tùy theo pH đất canh tác;

- Phân vô cơ lượng nguyên chất: 150 kg N - 250 kg P₂O₅ - 120 kg K₂O.

Lưu ý: Chuyển lượng phân hóa học nguyên chất qua phân đơn hoặc NPK tương đương:

Cách bón:

Bón lót toàn bộ phân chuồng hoai, phân hữu cơ vi sinh, vôi bột, lân khi làm đất.

Bón thúc lần 1: Sau khi trồng 7 - 10 ngày, bón 20% N.

Bón thúc lần 2: Sau khi có hoa cái, bón 30 % N + 60% K₂O.

Bón thúc lần 3: Sau lần bón 2 10 ngày, bón 50% N + 40% K₂O.

5. Chăm sóc:

+ Tưới nước:

Cây cần được tưới đủ nước, nguồn nước tưới phải sạch, không bị ô nhiễm, đặc biệt là trong giai đoạn cây ra hoa và bắt đầu phát triển trái. Tuy nhiên cây cũng rất sợ úng nước, do đó đất cần phải được thoát nước tốt, nhất là vào mùa mưa.

+ Chăm sóc và làm giàn:

Bấm ngọn: Khi cây có 4-6 lá thật, bấm ngọn cho ra nhánh phụ giúp cây cho trái nhiều và tập trung.

Thường xuyên làm sạch cỏ ở gốc cây, cắt bỏ những lá già ở phía dưới để tạo độ thông thoáng cho ruộng.

Làm giàn: Để thuận tiện cho việc chăm sóc và thu hoạch mướp nên làm giàn chữ A hoặc chữ U.

Cần thường xuyên theo dõi cây để sớm phát hiện các vấn đề về sâu bệnh hại và có biện pháp xử lý kịp thời.

6. Phòng trừ sâu bệnh:

Các Loại côn trùng gây hại thường gặp: Sâu xám, sâu vẽ bùa, sâu xanh ăn lá, rầy xanh, ruồi đục trái, bọ trĩ, rầy nhót, bọ phấn trắng, dòi đục thân...

Các Loại bệnh hại thường gặp: Bệnh sương mai, phấn trắng, đốm lá, cháy lá, thán thư, héo rũ...

Biện Pháp phòng trừ: Áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM

+ Biện pháp canh tác kỹ thuật:

Thời vụ: Bố trí thời vụ thích hợp với từng vùng miền, bố trí công thức luân canh, xen canh với các giống cây trồng khác họ.

Vệ sinh đồng ruộng: Loại bỏ các cây (hoặc các phần cây) bị nhiễm bệnh trên đồng ruộng, thu gom tập trung và xử lý sẽ giúp ngăn ngừa sự lan truyền của các tác nhân gây bệnh tới các cây khỏe.

Xử lý đất: Phơi ải, ngâm ruộng để diệt mầm bệnh và trứng, nhộng ở trong đất.

+ Biện pháp sinh học:

Sử dụng các chế phẩm sinh học để phòng trừ sâu bệnh hại, hạn chế sử dụng thuốc hóa học có độ độc cao ảnh hưởng đến thiên địch có lợi như ong ký sinh, bọ xit bắt mồi, nhện bắt mồi....

+ Biện pháp vật lý:

Bẫy côn trùng: Sử dụng các loại bẫy bả như bẫy chua ngọt, bẫy dính, bẫy pheromone, bẫy đèn... để bắt côn trùng trưởng thành.

Sử dụng màng phủ đất để hạn chế cỏ dại và một số dịch bệnh trong đất.

+ Biện pháp hóa học:

Sử dụng hóa chất khi cần thiết và hợp lý, sau khi áp dụng các biện pháp trên không có hiệu quả, khi mật độ dịch hại phát triển đến ngưỡng gây thiệt hại về kinh tế. Tuy nhiên, khi sử dụng thuốc phải cân nhắc kỹ theo nguyên tắc 4 đúng (đúng chủng loại, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đúng cách) và nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc trước khi dùng.

Lưu ý: Không sử dụng các loại thuốc có những hoạt chất cấm sử dụng.

7. Thu hoạch:

Cây được 40 - 45 ngày sau khi gieo có thể bắt đầu thu hoạch quả ăn non, nên thu hoạch quả đúng lứa vào buổi sáng, tránh xây xát, dập nát..., đóng gói, vận chuyển theo yêu cầu của khách hàng hoặc để quả già thu hoạch làm đồ mỹ nghệ.

Trước khi thu hoạch cần phải cách ly thuốc BVTV và phân bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất phân, thuốc để đảm bảo an toàn cho người sử dụng./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2026

CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG PHÚ NÔNG

(Ký tên, đóng dấu)



2
Phan Thị Triều Cẩm