

## QUY TRÌNH CANH TÁC GIỐNG HOA CÚC LÁ NHÁM KÉP MIX 123

### 1. Đặc điểm của giống và thời vụ gieo trồng:

- **Đặc điểm giống:** Hoa có nhiều màu (hồng đậm, hồng nhạt, vàng cam, đỏ...) sắc hoa rực rỡ, lâu tàn, đường kính 4 - 5 cm, cây cao 20 - 25 cm. Cây có sức sống mạnh, dễ trồng. Hoa nở sau gieo khoảng 50 - 60 ngày. Mỗi cây có thể nở 20 - 30 bông. Trung du miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ có thể gieo trồng từ tháng 2 đến tháng 9. Các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng Bằng sông Cửu Long có thể trồng quanh năm.

### 1. Đất trồng và mật độ trồng:

Cây ưa phát triển trên nền đất tơi xốp, thoát nước, giữ ẩm tốt.

Giá thể dùng để trồng bao gồm mun xơ dừa + Trấu sống hoặc trấu hun + phân bò tỉ lệ 2:1:1.

Lựa chọn kích thước chậu trồng phù hợp với số lượng cây trồng trên chậu. Thông thường nên chọn loại chậu có đường kính 20cm, độ sâu 15-20cm để trồng 1 cây (mỗi mét vuông để được 16 chậu trồng). Nếu muốn trồng nhiều cây trên chậu phải dùng loại chậu có kích thước lớn hơn. Mật độ trồng khoảng 155.000-160.000 cây/ ha.

### 2. Xử lý hạt giống và gieo hạt:

Hạt có thể gieo trực tiếp vào khay hoặc bầu ươm.

Mỗi lỗ ươm gieo 1 hạt sau đó phủ lên hạt một lớp đất mỏng sau đó tưới ẩm.

Tưới ẩm bằng vòi phun sương ngày 02 lần vào buổi sáng và chiều.

Sau 3 - 4 ngày hạt bắt đầu nảy mầm. Trong thời gian ươm cây con cần che nắng bằng lưới đen hoặc lưới che nắng.

Sau 5 - 6 ngày tiến hành tháo lưới che hoặc đem cây (khay ươm) ra nắng chăm sóc.

### 3. Bón phân:

Lượng phân bón cho 1.000 chậu hoa (1 cây/chậu) gồm :10kg lân, 15-18kg DAP và 30-40kg NPK 20-20-15.

Bón lót: Trộn toàn bộ Lân vào giá thể trồng.

Lần 1: Giai đoạn cây con 8 - 10 ngày sau gieo: 1kg DAP (tỉ lệ 1/500) tưới cho cây, sau đó tưới rửa lại tránh phân đọng lâu trên lá sẽ làm cháy lá non.

Lần 2: Sau khi trồng 7 ngày: sử dụng 7 kg DAP để tưới cho cây.

Lần 3: Cách lần 2 khoảng 15 ngày: Sử dụng 7 - 10kg DAP tưới hoặc bón gốc cho cây, mỗi cây khoảng 7 - 10g

Lần 4,5,6: Cách lần bón trước 10 ngày: Mỗi lần dùng 10 - 13kg NPK (20-20-15) tưới hoặc bón gốc cho cây, mỗi cây khoảng 10 - 13g.

### 4. Cách trồng và chăm sóc:

### 5.1. Bấm ngọn, tỉa chèo:

Để cây có nhiều nhánh và tán cây đẹp hơn nên bấm ngọn khi cây được 5-6 cặp lá. Trong quá trình phát triển của cây nên tỉa bớt các cành hư, sâu, bệnh, kém phát triển để tạo sự thông thoáng cho các cành khác được phát triển đều và tốt hơn.

### 5.2. Tưới nước:

Thường xuyên tưới nước theo tần suất 2 lần/ngày vào sáng sớm và chiều mát, khoảng 10 giờ sáng và sau 16 giờ. Trong đó, tưới nhiều vào buổi sáng và lần còn lại tưới ít hơn. Nếu trời mưa, hoặc đất trồng thừa nước cần xới xáo để thoát nước.

### 5. Phòng trừ sâu bệnh:

**Các loại côn trùng gây hại:** Sâu xanh, rệp sáp, rệp muội,...

**Các loại nấm bệnh thường gặp:** Héo rũ gây chết cả cây do nấm, thối cổ rễ cây con, lở cổ rễ, chết rạp cây con, ...

**Biện pháp phòng trừ:** Áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM

+ **Biện pháp canh tác kỹ thuật:**

Trồng nơi khô thoáng, tránh ẩm thấp, loại bỏ các cây và lá bị nhiễm bệnh, thu gom tập trung và xử lý sẽ giúp ngăn ngừa sự lan truyền của các tác nhân gây bệnh tới các cây khỏe.

Hạn chế chậu trồng tiếp xúc trực tiếp với đất.

Nên phủ bạt các luống trồng.

+ **Biện pháp sinh học:** Sử dụng các chế phẩm sinh học để phòng trừ sâu bệnh hại, hạn chế sử dụng thuốc hóa học có độ độc cao ảnh hưởng đến thiên địch có lợi như ong ký sinh, bọ xít bắt mồi, nhện bắt mồi....

+ **Biện pháp vật lý:**

Bẫy côn trùng: Sử dụng các loại bẫy bả như bẫy chua ngọt, bẫy dính, bẫy pheromone, bẫy đèn... để bắt côn trùng trưởng thành.

+ **Biện pháp hóa học:**

Sử dụng hóa chất khi cần thiết và hợp lý, sau khi áp dụng các biện pháp trên không có hiệu quả, khi mật độ dịch hại phát triển đến ngưỡng gây thiệt hại về kinh tế. Tuy nhiên, khi sử dụng thuốc phải cân nhắc kỹ theo nguyên tắc 4 đúng (đúng chủng loại, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đúng cách) và nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc trước khi dùng.

*Lưu ý: Không sử dụng các loại thuốc có những hoạt chất cấm sử dụng.*

### 7. Thu hoạch:

Cây được 50-60 ngày sau gieo hoa sẽ bắt đầu nở, khoảng 5-7 ngày tiếp theo sẽ cho hoa nở rộ, cây khỏe có thể xuất vườn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2026

**CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG PHÚ NÔNG**

(Ký tên, đóng dấu)

**GIÁM ĐỐC**



2 *Phan Thị Triệu Tâm*

