

QUY TRÌNH CANH TÁC GIỐNG BẦU GREEN 599

1. Đặc điểm của giống và thời vụ gieo trồng:

- Giống sinh trưởng mạnh và sinh trưởng rất khỏe. Thân ngọn mập, có màu xanh mướt rất đẹp, ăn ngon ngọt. Thu hoạch lần đầu khoảng 30 - 40 ngày sau gieo. Năng suất ngọn trung bình đạt 25 - 35 tấn/ha.

- Thời vụ: Miền Bắc và Miền Trung nên xuống giống vụ Xuân Hè và Hè Thu còn lại các tỉnh Miền Nam và Tây nguyên có thể gieo trồng quanh năm, chính vụ Đông Xuân, Xuân Hè.

2. Đất trồng:

Đất trồng có thành phần cơ giới nhẹ, thoát nước tốt, loại đất thích hợp nhất là đất thịt pha cát, độ pH thích hợp từ 6 - 6,5.

Chọn đất vụ trước không trồng họ bầu bí (Bí ngon, dưa hấu, bí rợ...) là tốt nhất. Đất trồng Bầu phải cày bừa kỹ cho tơi xốp, làm sạch cỏ, trồng vào mùa mưa phải lên luống cao 30 - 35cm và đào rãnh thoát nước tốt. Luống trồng có thể phủ bạt nylon để giữ ẩm và hạn chế cỏ dại.

Bón 300 - 500 kg vôi/ha, nếu pH đất <6 phải tăng lượng vôi.

Sau khi bón vôi 10-15 ngày thì tiến hành bón lót, lên luống và phủ bạt.

Mật độ gieo trồng: Hàng đôi cách hàng đôi 2,8-3 m, cây cách cây từ 0,4 - 0,5 m. Mật độ khoảng 14.000 - 18.000 cây/ha. Sử dụng khoảng từ 2 - 2,5 kg hạt giống/ha.

3. Xử lý hạt giống & gieo hạt:

Để hạt nảy mầm nhanh và đều nên ngâm ủ hạt trước khi gieo. Ngâm hạt vào nước ấm (2 sôi + 3 lạnh) trong 6-8 giờ sau đó rửa lại bằng nước sạch, mang ra hong nắng hạt khoảng 1 giờ. Hạt có thể mang ra gieo trực tiếp hoặc ủ hạt đến khi bắt đầu nảy mầm thì mới mang ra gieo. Thông thường hạt bắt đầu nảy mầm khoảng 24-36 giờ sau khi ủ. Những hạt chưa nảy mầm đem rửa sạch để ráo rồi ủ lại đến khi hạt nảy mầm tiếp tục gieo.

Tùy theo thời vụ mà ta có thể gieo thẳng ngoài đồng hoặc gieo vô bầu ươm, khay ươm, cây con có 1 lá thật (6-8 ngày) là có thể đem trồng.

4. Phân bón:

Lượng phân tổng số tính cho 1 ha/vụ: Phân chuồng hoai 25 - 30m³ hoặc phân hữu cơ vi sinh 1.000 kg; vôi bột 300 - 500 kg

Phân vô cơ: 225 kg N - 250 kg P₂O₅ - 160 kg K₂O.

Lưu ý: Chuyển lượng phân hóa học nguyên chất qua phân đơn hoặc NPK tương ứng.

Cách bón:

Bón lót toàn bộ phân chuồng hoai, phân hữu cơ vi sinh, vôi bột, lân khi làm đất.

Bón thúc lần 1 (7 - 10 ngày sau trồng): bón 10% N.

Bón thúc lần 2 (17 ngày sau trồng): bón 20% N, 25% K₂O.

Bón thúc lần 3 (30 ngày sau trồng): bón 25% N, 25% K₂O.

Bón thúc lần 4 (45 ngày sau trồng): bón 20% N, 25% K₂O.

Bón thúc lần 5 (60 ngày sau trồng): bón 25% N, 25% K₂O.

5. Chăm sóc:

Khi cây đã có 4-5 lá thật, cây sắp ngã ngọn thì bón thúc để cây vươn lóng và ngoi ngọn. Bón cách gốc 15 - 20cm, xới nhẹ kết hợp vun gốc cho cây.

Khi ngọn đã bò dài 80-100cm thì bắt đầu thu hoạch lúa đầu tiên bằng cách cắt tất cả các ngọn chính cách gốc 20-30 cm. Sau đó, tiến hành nhổ sạch cỏ dại, rạch hàng cách gốc 20-25 cm, bón thúc phân, lấp đất rồi tưới nhẹ. Khi các chồi gốc đã phát triển, ngắt bỏ những chồi nhỏ, yếu, giữ lại mỗi gốc 2-3 chồi khỏe nhất.

Các lúa thu hái tiếp theo cũng làm tương tự, khi ngọn đã dài 50-70cm, cắt ngọn gần sát gốc (để lại 2 - 3 mắt lá) và tiếp tục bón thúc, vun gốc và tưới nước đủ ẩm thường xuyên cho cây ra nhiều chồi mới.

6. Phòng trừ sâu bệnh:

Các loại côn trùng gây hại thường gặp: Sâu xám, sâu vẽ bùa, sâu xanh ăn lá, rầy xanh, bọ trĩ, rầy nhót, bọ phấn trắng,...

Các loại bệnh hại thường gặp: Bệnh phấn trắng, héo xanh, đóm lá, thán thư, ...

+ **Biện pháp phòng trừ:** Áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM - Biện pháp canh tác kỹ thuật:

Thời vụ: bố trí thời vụ thích hợp với từng vùng miền, bố trí công thức luân canh, xen canh với các giống cây trồng khác họ.

Vệ sinh đồng ruộng: loại bỏ các cây (hoặc các phần cây) bị nhiễm bệnh, thu gom tập trung và xử lý sẽ giúp ngăn ngừa sự lan truyền của các tác nhân gây bệnh tới các cây khỏe.

Xử lý đất: phơi ải, ngâm ruộng để diệt mầm bệnh và trứng, nhộng ở trong đất.

Biện pháp sinh học:

Sử dụng các chế phẩm sinh học để phòng trừ sâu bệnh hại, hạn chế sử dụng thuốc hóa học có độ độc cao ảnh hưởng đến thiên địch có lợi như ong ký sinh, bọ xít bắt mồi, nhện bắt mồi,...

+ **Biện pháp vật lý:**

Bẫy côn trùng: sử dụng bẫy chua ngọt, bẫy dính, bẫy pheromone, bẫy đèn,... để bắt côn trùng trưởng thành.

Sử dụng màng phủ đất để hạn chế cỏ dại và một số bệnh hại trong đất.

Biện pháp hóa học:

Sử dụng hóa chất khi cần thiết và hợp lý, sau khi áp dụng các biện pháp trên không có hiệu quả, khi mật độ dịch hại phát triển đến ngưỡng gây thiệt hại về kinh tế. Tuy nhiên, khi sử dụng thuốc phải cân nhắc kỹ theo nguyên tắc 4 đúng (đúng chủng loại, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đúng cách) và nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc trước khi dùng.

Lưu ý: Không sử dụng các loại thuốc có những hoạt chất cấm sử dụng.

7. Thu hoạch:

Sau khi gieo khoảng 30 - 40 ngày bắt đầu thu hoạch lúa đầu. Thu hái lúa đầu bằng cách dùng dao cắt tất cả các ngọn, để lại cách gốc 20 - 30 cm. Các lúa tiếp theo thu hoạch khi ngọn mới đã vươn dài từ 50 - 70 cm.

Khi thu hoạch tránh làm gãy ngọn, dập nát. Xuất hàng đóng gói vận chuyển theo yêu cầu của khách hàng. Sau mỗi lứa thu hoạch tiến hành bổ sung dinh dưỡng để cây ra ngọn các lứa sau.

Trước khi thu hoạch cần phải cách ly thuốc BVTV và phân bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất phân, thuốc để đảm bảo an toàn cho người sử dụng./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2026
CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG PHÚ NÔNG
(Ký tên, đóng dấu)

GIÁM ĐỐC



Phan Thị Triều Tâm