

5. Phân bón và chăm sóc:

5.1. Tưới nước:

Thường xuyên tưới nước theo tần suất 3 lần/ngày vào sáng sớm, khoảng 10 giờ sáng và sau 16 giờ. Trong đó, tưới nhiều vào buổi sáng và những lần còn lại tưới ít hơn. Nếu trời mưa, hoặc đất trồng thừa nước cần xới xáo để thoát nước

5.2. Phân Bón:

Lượng phân bón cho 1.000 chậu hoa (mật độ trồng 1 cây/ chậu) gồm :5kg bánh dầu xay nhuyễn (ngâm trước khi gieo 20 ngày), 1kg DAP, 1kg NPK (16-16-8)

Lần 1 (tưới nhũ): Sau trồng 3-4 ngày: sử dụng 100% phân DAP (tỉ lệ 1/500) tưới cho cây.

Lần 2: Cách 7-10 ngày sau khi tưới phân lần 1: sử dụng 20% bánh dầu+ 20% NPK (16-16-8) để tưới cho cây.

Lần 3,4,5,6: Bón cách lần bón trước 7-10 ngày: bón giống như lần 2.

Sau khi trồng 15-17 ngày nên bổ sung hỗn hợp giá thể vào cho đầy chậu.

5.3. Bấm ngọn tỉa chèo:

– Khi cây có 5 đến 6 cặp lá và những chồi nách ở lá 1,2,3 cũng phát triển theo, tức là sau 30-35 ngày tuổi tiến hành bấm ngọn (cơi đọt lần 1). Có thể cơi đọt lần 2, lần 3, số lần cơi đọt phụ thuộc vào kỹ thuật trồng của từng nhà vườn. Cơi đọt càng nhiều lần thì số hoa càng nhiều. Tuy nhiên, cơi đọt nhiều sẽ làm cho đường kính hoa nhỏ lại.

– Khi bấm ngọn những cây phát triển tốt thì chúng ta để lại 5-6 cặp lá, cây phát triển kém thì để lại 4 cặp lá.

– Sau mỗi lần cơi đọt nên sử dụng phân bón lá có gốc lân cao để tạo mầm chồi cho tốt.

6. Phòng trừ sâu bệnh:

1. Phòng trừ sâu bệnh:

Các loại côn trùng gây hại: Sâu xanh, sâu vẽ bùa, sâu ăn tạp....

Các loại nấm bệnh thường gặp: Hoa vụn thọt thường dễ héo rũ gây chết cả cây do nấm, quần đọt do bọ trĩ truyền virus, thối cổ rễ cây con, chết rạp cây con, ...

Biện Pháp phòng trừ: Áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM

+ Biện pháp canh tác kỹ thuật:

Trồng nơi khô thoáng, tránh ẩm thấp, loại bỏ các cây và lá bị nhiễm bệnh, thu gom tập trung và xử lý sẽ giúp ngăn ngừa sự lan truyền của các tác nhân gây bệnh tới các cây khỏe.

+ **Biện pháp sinh học:** Sử dụng các chế phẩm sinh học để phòng trừ sâu bệnh hại, hạn chế sử dụng thuốc hóa học có độ độc cao ảnh hưởng đến thiên địch có lợi như ong ký sinh, bọ xít bắt mồi, nhện bắt mồi....

+ Biện pháp vật lý:

Bẫy côn trùng: Sử dụng các loại bẫy bả như bẫy chua ngọt, bẫy dính, bẫy pheromone, bẫy đèn... để bắt côn trùng trưởng thành.

+ **Biện pháp hóa học:** Sử dụng hóa chất khi cần thiết và hợp lý, sau khi áp dụng các biện pháp trên không có hiệu quả, khi mật độ dịch hại phát triển đến ngưỡng gây thiệt hại về kinh tế. Tuy nhiên, khi sử dụng thuốc phải cân nhắc kỹ theo nguyên tắc 4 đúng (đúng chủng loại, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đúng cách) và nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc trước khi dùng.

Lưu ý: Không sử dụng các loại thuốc có những hoạt chất cấm sử dụng.

7. Thu hoạch:

Khi hoa nở được khoảng 1/3 số bông trên cành là có thể xuất vườn. Hoặc tùy theo nhu cầu của khách hàng mà tiến hành thu hoạch theo độ nở của hoa.

Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07, năm 2024

CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG PHÚ NÔNG

(Ký tên, đóng dấu)

GIÁM ĐỐC



Phan Thị Triều Tâm