

QUY TRÌNH KỸ THUẬT CANH TÁC GIỐNG HOA DỪA CẠN

1. Đối tượng và thời vụ áp dụng:

1.1. Đối tượng áp dụng:

STT	TÊN GIỐNG	STT	TÊN GIỐNG
1	Hoa Dừa cạn apricot 501	13	Hoa Dừa cạn strawberry 511
2	Hoa Dừa cạn mix 500	14	Hoa Dừa cạn lavender 513
3	Hoa Dừa cạn orchid halo 506	15	Hoa Dừa cạn peach pink 509
4	Hoa Dừa cạn pink halo 507	16	Hoa Dừa cạn rũ mix 100
5	Hoa Dừa cạn polka dot 515	17	Hoa Dừa cạn rũ PN 101
6	Hoa Dừa cạn purple 508	18	Hoa Dừa cạn pacific mix 200
7	Hoa Dừa cạn red 503	19	Hoa Dừa cạn pacific burgundy 204
8	Hoa Dừa cạn burgundy with eye 510	20	Hoa Dừa cạn pacific really red 217
9	Hoa Dừa cạn dark red 516	21	Hoa Dừa cạn pacific dard red 208
10	Hoa Dừa cạn raspberry 502	22	Hoa Dừa cạn pacific cherry red halo 205
11	Hoa Dừa cạn ice pink 512	23	Hoa Dừa cạn pacific burgundy halo 203
12	Hoa Dừa cạn grape 505	24	Hoa Dừa cạn đứng PN-21

1.2. Thời vụ:

Có thể trồng quanh năm trên tất cả vùng sinh thái trong cả nước

2. Ươm cây con

Đề hạt giống nảy mầm nhanh và đồng đều nên ngâm hạt giống trước khi gieo trong nước ấm (2 sôi – 3 lạnh) trong khoảng 3-4 giờ. Sau khi ngâm xong vớt hạt giống ra khăn sạch và để ráo nước.

Gieo hạt trực tiếp vào khay đã có đất ươm.

- Mỗi lỗ ươm gieo 1 hạt sau đó phủ lên hạt một lớp đất mỏng khoảng 0,1 cm sau đó tưới ẩm.
- Tưới ẩm bằng vòi phun sương ngày 02 lần vào buổi sáng và chiều.

- Sau 3-6 ngày hạt bắt đầu nảy mầm. Trong thời gian ươm cây con cần che nắng bằng lưới đen hoặc lưới che nắng.
- Sau 7-10 ngày tiến hành tháo lưới che hoặc đem cây (khay ươm) ra nắng chăm sóc.

3. Chuẩn bị đất trồng và chậu trồng

Cây ưa phát triển trên nền đất tơi xốp, thoát nước, giữ ẩm tốt và có pH 5,8-6,2. Đất gieo hạt tốt nhất nên dùng giá thể bao gồm có đất + mụn xơ dừa + trấu hun tỉ lệ 1:1:1 hoặc xơ dừa + trấu hun tỉ lệ 1:1.

Lựa chọn kích thước chậu trồng phù hợp với số lượng cây trồng trên chậu. Thông thường nên chọn loại chậu có đường kính 15-20cm, độ sâu 15-20cm để trồng 1 cây. Nếu muốn trồng nhiều cây trên chậu phải dùng loại chậu có kích thước lớn hơn.

4. Tiến hành trồng

Khi cây con được 4-5 cặp lá thật (khoảng 25-30 ngày sau gieo) thì bắt đầu trồng vào chậu. Chọn những cây xanh tốt, thân mập, khỏe nếu trồng nhiều cây trên chậu nên chọn những cây đều nhau trồng chung 1 chậu để cây phát triển đồng đều.

5. Phân bón và chăm sóc

5.1. Tưới nước:

Thường xuyên tưới nước theo tần suất 2 lần/ngày vào sáng sớm và chiều mát, khoảng 10 giờ sáng và sau 16 giờ. Trong đó, tưới nhiều vào buổi sáng và lần còn lại tưới ít hơn. Nếu trời mưa, hoặc đất trồng thừa nước cần xới xáo để thoát nước.

5.2. Phân Bón:

Lượng phân bón cho 1.000 chậu hoa (1 cây/chậu) gồm :15-18kg DAP và 40-50kg NPK 20-20-15.

Lần 1: Giai đoạn cây con 20-25 ngày sau gieo: 1kg DAP (tỉ lệ 1/500) tưới cho cây, sau đó tưới rửa lại tránh phân đọng lâu trên lá sẽ làm cháy lá non.

Lần 2: Sau khi trồng 7 ngày: sử dụng 7 kg DAP để tưới cho cây.

Lần 3: Cách lần 2 khoảng 7-10 ngày : Sử dụng 7-10kg DAP tưới hoặc bón gốc cho cây, mỗi cây khoảng 7-10g

Lần 4,5,6,7: Cách lần bón trước 7 ngày: Mỗi lần dùng 10-13kg NPK (20-20-15) tưới hoặc bón gốc cho cây, mỗi cây khoảng 10-13g.

5.3. Bấm ngọn :

Để cây có nhiều nhánh và tán cây đẹp hơn nên bấm ngọn 2 lần cho cây.

Khoảng 07 đến 10 ngày sau trồng tiến hành bấm đợt lần đầu.

Bấm đợt lần 2 sau lần đầu khoảng 10-14 ngày.

6. Phòng trừ sâu bệnh

Các loại côn trùng gây hại: Sâu Khoai, rệp sáp,....

Các loại nấm bệnh thường gặp: Héo rũ gây chết cả cây do nấm, thối cổ rễ cây con, lở cổ rễ, chết rạp cây con, ...

Biện Pháp phòng trừ: Áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM

+ **Biện pháp canh tác kỹ thuật**

Trồng nơi khô thoáng, tránh ẩm thấp, loại bỏ các cây và lá bị nhiễm bệnh, thu gom tập trung và xử lý sẽ giúp ngăn ngừa sự lan truyền của các tác nhân gây bệnh tới các cây khỏe.

Hạn chế chậu trồng tiếp xúc trực tiếp với đất.

Nên phủ bạt các luống trồng.

+ **Biện pháp sinh học:** Sử dụng các chế phẩm sinh học để phòng trừ sâu bệnh hại, hạn chế sử dụng thuốc hóa học có độ độc cao ảnh hưởng đến thiên địch có lợi như ong ký sinh, bọ xít bắt mồi, nhện bắt mồi....

+ **Biện pháp vật lý**

Bẫy côn trùng: Sử dụng các loại bẫy bả như bẫy chua ngọt, bẫy dính, bẫy pheromone, bẫy đèn... để bắt côn trùng trưởng thành.

+ **Biện pháp hóa học:**

Sử dụng hóa chất khi cần thiết và hợp lý, sau khi áp dụng các biện pháp trên không có hiệu quả, khi mật độ dịch hại phát triển đến ngưỡng gây thiệt hại về kinh tế. Tuy nhiên, khi sử dụng thuốc phải cân nhắc kỹ theo nguyên tắc 4 đúng (đúng chủng loại, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đúng cách) và nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc trước khi dùng.


Lưu ý: Không sử dụng các loại thuốc có những hoạt chất cấm sử dụng.

7. Thu hoạch

Cây được 80-90 ngày sau gieo sẽ cho hoa nở rộ, cây khỏe có thể xuất vườn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01, năm 2021

CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG PHÚ NÔNG

GIÁM ĐỐC

am
Phan Thị Triều Tâm