

QUY TRÌNH CANH TÁC GIỐNG HOA THANH TRÚC PN 15

1. Đối tượng áp dụng và thời vụ:

- Đối tượng áp dụng: HOA THANH TRÚC PN 15.
- Thời vụ: Giống trồng được quanh năm tại tất cả các vùng sinh thái trên cả nước. Nhiệt độ trồng thích hợp từ 20 - 32 độ C. Nhiệt độ dưới 20 độ C và trên 32 độ C cây sẽ sinh trưởng kém, chậm phát triển.

2. Đất trồng:

Thanh trúc thích hợp trồng trong bồn hoa hoặc trồng chậu.

Trồng cây trong chậu nhựa có đường kính và chiều cao lần lượt 15cm và 12cm. Ước tính có thể trồng được 250.000 - 300.000 chậu/ha.

Giá thể trồng phải tơi xốp, thoát nước tốt, không chứa mầm bệnh hại. Có thể trộn hỗn hợp bao gồm: đất sạch, phân chuồng, xơ dừa và trấu hun (đã xử lý), bổ sung thêm nấm trico, ủ khoảng 2 tháng.

3. Xử lý hạt giống và gieo hạt:

Gieo hạt trực tiếp vào vỉ ươm, có phủ một lớp xơ dừa mịn, cung cấp đủ ẩm để hạt nảy mầm. Để vào chỗ tối hoặc mát, tưới nước giữ ẩm thường xuyên, sau khoảng 5 - 7 ngày hạt sẽ nảy mầm. Khi hạt mọc mầm và bắt đầu có lá thật, đưa vỉ ươm ra nơi có ánh sáng để tránh cây bị vóng, cần có lưới che nếu ánh nắng quá gay gắt.

4. Bón phân:

Lượng phân bón cho 1.000 chậu hoa (1 cây/chậu) gồm :15 - 18kg DAP và 40 -50kg NPK 20-20-15.

- Lần 1: Giai đoạn cây con 20-25 ngày sau gieo: 1kg DAP (tỉ lệ 1/500) tưới cho cây, sau đó tưới rửa lại tránh phân đọng lâu trên lá sẽ làm cháy lá non.
- Lần 2: Sau khi trồng 7 ngày: sử dụng 7 kg DAP để tưới cho cây.
- Lần 3: Cách lần 2 khoảng 7 - 10 ngày: Sử dụng 7-10kg DAP tưới hoặc bón gốc cho cây, mỗi cây khoảng 7 - 10g
- Lần 4,5,6,7: Cách lần bón trước 7 ngày: Mỗi lần dùng 10-13kg NPK (20-20-15) tưới hoặc bón gốc cho cây, mỗi cây khoảng 10 - 13g.

Bổ sung thêm phân bón lá phù hợp cho từng giai đoạn (giai đoạn cây con, giai đoạn trước khi ra hoa và giai đoạn ra hoa), để giúp thân lá phát triển nhanh; kích thích phân hóa mầm hoa, ra nhiều hoa; dưỡng hoa, giúp hoa nở to, màu đẹp.

5. Chăm sóc:

Khi cây con được 2-3 lá thật, tiến hành trồng vào chậu. Trồng cây vào buổi chiều mát, hạn chế cây mất sức do sự thoát hơi nước. Cho giá thể đã xử lý vào chậu, cách miệng

chậu 3 cm. Chọn cây khỏe, mỗi chậu trồng một cây, cần che mát 2 - 3 ngày cho cây bén rễ, sau đó đưa chậu cây ra ngoài nắng. Lúc này cây cần nhiều ánh sáng mặt trời để sinh trưởng và ra hoa. Nhưng nếu ánh nắng quá gay gắt, cần che một lớp lưới cho cây. Thường xuyên quan sát đất trong chậu, cung cấp nước ẩm độ vừa phải, tránh ngập úng, ẩm độ cao làm cho cây dễ bị bệnh. Quan sát sự sinh trưởng và phát triển của cây để bổ sung dinh dưỡng hoặc xử lý sâu bệnh kịp thời.

Bấm ngọn: khi cây được 5 - 6 lá thật, tiến hành bấm ngọn để cây có nhiều cành nhánh và tạo tán cho cây.

6. Phòng trừ sâu bệnh:

- **Các loại côn trùng gây hại thường gặp:** Sâu ăn lá, rầy mềm, bọ phấn trắng, bọ trĩ, nhện đỏ,...

Biện pháp phòng trừ: sử dụng các loại thuốc trừ sâu trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam theo hướng dẫn trên bao bì của nhà sản xuất.

- **Các loại bệnh hại thường gặp:** Bệnh phấn trắng, đốm lá, héo xanh, thối gốc,...

Biện pháp phòng trừ:

Xử lý giá thể: trước khi trồng, giá thể phải được xử lý nấm bệnh.

Bố trí khoảng cách các chậu vừa phải, không quá gần để cho các cây có thể nhận đủ ánh sáng và không khí lưu thông đầy đủ.

Loại bỏ các chậu cây (hoặc các phần cây) bị nhiễm bệnh, thu gom tập trung và xử lý sẽ giúp ngăn ngừa sự lan truyền của các tác nhân gây bệnh.

Sử dụng tấm bạt phủ cỏ, để hạn chế cỏ dại và một số bệnh hại trong đất; kê chậu để chậu thoát nước tốt.

Sử dụng các loại thuốc trừ bệnh trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam theo hướng dẫn trên bao bì của nhà sản xuất.

7. Thu hoạch:

Cây được 65 - 75 ngày sau gieo sẽ cho hoa nở rộ, cây khỏe có thể xuất vườn.

Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2024

CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG PHÚ NÔNG

(Ký tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Phan Thị Triệu Tâm