

QUY TRÌNH KỸ THUẬT CANH TÁC

1. *Đối tượng và thời vụ áp dụng*

1.1 *Đối tượng*

TT	TÊN GIỐNG
1	Xà Lách PN 978
2	Xà Lách Vàng No.2
3	Xà Lách Minetto No.1
4	Xà Lách Minetto No.9
5	Xà Lách Búp Thảo Nguyên No.5
6	Xà Lách Búp Hải Phòng 01
7	Xà Lách Búp Đăm HN 05
8	Xà Lách Lollo Rossa PN 9
9	Xà Lách Xoăn Sư Tử Hạt Đen No.8
10	Xà Lách Búp Ý No.8

1.2 *Thời vụ*

Có thể trồng quanh năm, tuy nhiên đối với những giống xà lách búp như minetto, búp ý, búp đăm chỉ cuốn búp và cho năng suất cao trong vụ có thời tiết mát mẻ (chính vụ tháng 9 đến tháng 4 năm sau).

2. *Đất trồng:*

Đất thích hợp để trồng là đất tơi xốp, nhẹ, nhiều mùn, tầng canh tác dày, thoát nước tốt như đất phù sa ven sông ít sét, đất thịt pha cát có nhiều chất hữu cơ. Đất không bị phèn mặn, độ pH thích hợp từ 5,5 – 6,5.

Cần cày xới đất cho tơi xốp, dọn sạch cỏ rác, các tàn dư thực vật của mùa trước, rải 300-500kg vôi/ha từ 7-10 ngày trước khi trồng để diệt một số nấm bệnh hại trong đất.

Lên luống rộng 1.2-1.5m, cao 15 - 20cm và mùa mưa lên luống cao từ 20 - 25 cm để chống ngập úng.

3. Xử lý & gieo hạt:

Lượng giống: 400-600g/ha

Gieo hạt khô, trước khi gieo cần tưới đất gieo một lượt nước. Sau gieo cần rải 1 lớp mỏng lấp. Cần tưới nước giữ ẩm thường xuyên cho hạt được nảy mầm tốt.

Sau khi gieo 12-15 ngày đem cây ra cấy.

Khoảng cách trồng: Hàng cách hàng 20-25cm, cây cách cây 15-25cm.

4. Bón phân:

Phân bón: Lượng phân tổng số tính cho 1 ha/vụ:

Phân chuồng hoai: 25 - 30m³ ; phân hữu cơ vi sinh: 1.000 kg; vôi bột: 300-500 kg, tùy theo pH đất canh tác.

Phân vô cơ lượng nguyên chất: 140 kg N – 120 kg P₂O₅ - 180 kg K₂O.

Lưu ý: Chuyển lượng phân hóa học nguyên chất qua phân đơn hoặc NPK tương đương.

Bón lót toàn bộ phân chuồng hoai, phân hữu cơ vi sinh, vôi bột, lân khi làm đất. Rải đều phân lên lớp dùng cuốc xới xáo trộn đều với đất mặt. Riêng lớp gieo hạt ươm cây con cần phải tăng lượng phân chuồng và tro để đất được xốp, cây con phát triển tốt hơn.

Bón thúc lần 1: Sau khi cây mọc 5-7 ngày 5% N (nồng độ dung dịch tưới là 2%) tưới cho cây con.

Lần 2: Sau khi cấy 3 ngày, tưới 15% N cho cây

Bón thúc lần 3: Sau lần 2 từ 3-5 ngày bón 40%N, 50% K₂O.

Bón thúc lần 4: Sau lần 3 từ 7-10 ngày bón 40%N, 50% K₂O.

Với những đất canh tác lâu năm và sử dụng nhiều phân hóa học nên bón hoặc tưới thêm phân trung vi lượng, Canxi, Bo ... sau trồng khoảng 10 - 15 ngày.

5. Chăm sóc:

Dùng vòi sen lỗ nhỏ để nước phân bố đều, cây ưa ẩm, nhưng không chịu được ngập úng. Do vậy, cần cung cấp lượng nước vừa đủ, tránh ngập úng gốc sẽ làm ảnh hưởng đến rễ. Vào mùa nắng, ngày tưới 2 lần: sáng sớm và chiều mát, tuy nhiên sau khi cấy cần tưới 3 lần: sáng, trưa, chiều, kéo dài khoảng 3-4 ngày để cây không bị héo mất sức. Trước cấy và sau cấy cần rải một lớp rơm hoặc trấu mỏng lên lớp để giữ ẩm và hạn chế đất văng bám vào lá và nén tầng đất mặt khi tưới nước và trời mưa.

Làm sạch cỏ trên luống, rãnh và xung quanh vườn, làm cỏ trước khi bón phân kết hợp xới tơi tạo đất thoáng khí. Cần kiểm soát kỹ giai đoạn cây con, thường xuyên thăm đồng để phòng trừ kịp thời các loại côn trùng, sâu, bệnh gây hại.

